

Living Donor Selection Criteria for Kidney Donation

Eligibility for Kidney Donation:

1. Good health
2. Minimum age of 18
3. Mental capacity and ability to make informed decisions.
4. Body mass index (BMI) less than 32. Potential donors with BMI >32 are considered on a case-by case basis.

Absolute Contraindications:

1. Chronic kidney disease
2. Active or incompletely treated malignancy
3. Condition that requires long term use of nephrotoxic medications
4. Psychosocial instability
5. Lack of social support
6. Uncontrolled psychiatric condition.
7. Ongoing illicit substance use or abuse with the exception of Marijuana
8. Active Smoking (tobacco)
9. History of recurrent and/or multiple active nephrolithiasis
10. Recurrent urinary tract infections or bladder dysfunction
11. Uncontrolled hypertension with evidence of end organ damage
12. Type 1 diabetes
13. Type 2 diabetes with evidence of end organ damage
14. Inability to adhere or non-compliance with living donor requirements
15. Poor functional status
16. High suspicion of coercion
17. Creatinine clearance less than 80ml/min
18. Any condition determined by the evaluating medical staff that makes the donor unsuitable to donate

Relative Contraindications:

1. History of diabetes or hypertension in multiple primary family members
2. Presence of Hepatitis B or Hepatitis C
3. HIV positive status (exception for recipients who share the same virus)
4. Evidence of acute symptomatic infection (until resolved)
5. Non- lawful presence in the United states

Criterios de selección de donantes en vida para la donación de riñón

Requisitos para la donación de riñón:

1. Buen estado de salud
2. Edad mínima de 18 años
3. Capacidad mental y aptitud para tomar decisiones informadas.
4. Índice de masa corporal (IMC) inferior a 32. Los posibles donantes con un IMC superior a 32 se evalúan caso por caso.

Contraindicaciones absolutas:

1. Enfermedad renal crónica
2. Neoplasia maligna activa o tratada de forma incompleta
3. Afección que requiera el uso prolongado de medicamentos nefrotóxicos
4. Inestabilidad psicosocial
5. Falta de apoyo social
6. Trastorno psiquiátrico no controlado.
7. Consumo o abuso continuo de sustancias ilícitas, a excepción de la marihuana
8. Tabaquismo activo
9. Antecedentes de nefrolitiasis recurrente y/o activa múltiple
10. Infecciones recurrentes del tracto urinario o disfunción vesical
11. Hipertensión no controlada con evidencia de daño en órganos diana
12. Diabetes tipo 1
13. Diabetes tipo 2 con evidencia de daño en órganos diana
14. Incapacidad para cumplir o incumplimiento de los requisitos para donantes vivos
15. Estado funcional deficiente
16. Alta sospecha de coacción
17. Depuración de creatinina inferior a 80ml/min
18. Cualquier condición que, a juicio del personal médico evaluador, haga que el donante no sea apto para donar

Contraindicaciones relativas:

1. Antecedentes de diabetes o hipertensión en varios familiares de primer grado
2. Presencia de hepatitis B o hepatitis C
3. Estado seropositivo para el VIH (excepto en receptores que comparten el mismo virus)
4. Evidencia de infección aguda sintomática (hasta su resolución)
5. Presencia migratoria no autorizada por la ley en los Estados Unidos.